

FIBRONECTINA FETALE

il test per individuare pazienti a rischio di PARTO PRETERMINE

TEST DI SCREENING NON INVASIVO

Il parto **Pretermine** (o prematuro) secondo la classificazione dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) è quel parto che avviene **prima della 36° settimana** di gravidanza. In realtà, i casi che hanno una maggiore importanza clinica sono quelli in cui il parto avviene prima della 32° settimana. **La prematurità** rappresenta una causa molto importante di **patologia neonatale**, con possibilità di danno neurologico, soprattutto nei sopravvissuti nati a bassissime epoche gestazionali.

il nuovo **test di screening per la ricerca della Fibronectina** nelle secrezioni vaginali è un valido ausilio e fornisce importanti dati relativamente al rischio reale di parto **Pretermine**, guidando la decisione del clinico in merito al ricovero ospedaliero ed alla somministrazione di terapia con tocolitici. Un risultato negativo con il test fFN indica un'elevata improbabilità che la donna partorisca entro una o due settimane.

Nel nostro Centro Diagnostico eseguiamo il nuovo marcatore biochimico **Fibronectina Fetale cervicovaginale (fFN)**, in pazienti sintomatiche e a rischio di **Parto Pretermine**.

IL TEST SI ESEGUE DA TAMPONE VAGINALE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: ☎ 095 355 888, inoltrare una e-mail: @ info@analiscata.com o in laboratorio chiedere in accettazione.


FIBRONECTINA FETALE