Anticorpi Anti Citrullina

PER LA DIAGNOSI PRECOCE DELL'ARTRITE REUMATOIDE

SIGNIFICATO E UTILITA' CLINICA DEL DOSAGGIO DELLA CCP IgG

Gli anticorpi anticitrullina sono utilizzati nella diagnosi dell'**artrite reumatoide** (A.R.). Essi sono diretti contro i residui citrullinati della proteina Fillagrina (peptide citrullinato ciclico) e mostrano sicuramente una maggiore specificità rispetto agli ormai obsoleti Reuma test e reazione di Waaler-Rose. Si riscontrano nel 60-80% dei pazienti affetti da A.R. e nel 30% di pazienti negativi per il fattore reumatoide. Inoltre hanno due importanti peculiarità: sono presenti nelle fasi iniziali, subcliniche della malattia, risultando utili nella diagnosi precoce e hanno valore anche come marker prognostico nell'evoluzione della malattia.

Di fronte a un ragionevole sospetto di AR il dosaggio degli anti CCP fornisce un'utile indicazione diagnostica, che in ambito reumatologico può facilitare un corretto approccio terapeutico e garantire al paziente una prognosi migliore grazie agli efficaci farmaci che ai nostri giorni si hanno a disposizione.

IL TEST SI ESEGUE CON UN PRELIEVO DI SANGUE SENZA PRENOTAZIONE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: 095 355 888 o inoltrare una e-mail: info@analisicata.com

