Malattia Celiaca

infiammazione cronica dell'intestino tenue

TEST DIAGNOSTICI PER LA RILEVAZIONE DELLA MALATTIA CELIACA

SIGNIFICATO CLINICO

La celiachia è una malattia autoimmune caratterizzata da un'inappropriata risposta immunitaria al glutine, una proteina presente nel grano, nella segale, nell'orzo. Gli esami sierologici della celiachia sono utili nella diagnosi e nel monitoraggio della celiachia e di altri disturbi relativi all'intolleranza del glutine e rilevano gli autoanticorpi (prodotti come risposta immunitaria) nel sangue del soggetto affetto.

La diagnosi si effettua mediante test di laboratorio basati sulla ricerca:

- Anticorpi **anti-transglutaminasi tissutale (anti-tTG) IgA**: è un esame che rileva gli anticorpi diretti contro la transglutaminasi dei tessuti, un enzima che favorisce la reticolazione di alcune proteine, è il test più sensibile e specifico per la celiachia. Nei pazienti carenti di IgA, viene richiesto il test anche per le IgG.
- Quantificazione di **Immunoglobuline A (IgA)**: la misura della concentrazione totale di IgA nel sangue per capire se il soggetto ha carenza o assenza di IgA
- Anticorpi **anti-gliadina deaminata IgA**: determina la presenza di anticorpi di classe IgA anti- gliadina deaminata e come per gli anti-tTG, possono essere testate le IgG nelle persone con carenza o assenza di IgA.
- Altri test usati più raramente, includono:
- Gli anticorpi **anti-endomisio (EMA) IgA**: rileva gli anticorpi diretti contro l'endomisio, il sottile strato di tessuto connettivo che ricopre le fibre muscolari

I TEST SI ESEGUONO CON UN PRELIEVO DI SANGUE SENZA PRENOTAZIONE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: 095 355 888 o inoltrare una e-mail: info@analisicata.com

