Emoglobina Glicata

Per monitorare il diabete del paziente e come supporto per le decisioni terapeutiche; come ausilio per identificare i soggetti ad aumentato rischio di sviluppare il diabete.

SIGNIFICATO CLINICO

Il test dell'HbA1c valuta la quantità media di glucosio nel sangue nel corso dei 2-3 mesi precedenti al prelievo. Questo esame consiste nel misurare la concentrazione della emoglobina glicata A1c (spesso chiamata anche emoglobina glicosilata). Il dosaggio è utilizzato per monitorare il trattamento nei soggetti cui è stato diagnosticato il diabete, ed è di aiuto per valutare se le concentrazioni di glucosio sono state mantenute sotto controllo nel tempo in cui il paziente ha seguito la terapia. Inoltre è fondamentale sia per lo screening che per la diagnosi di diabete e per valutare il rischio di sviluppare il diabete. Nel 2010 le linee guida per la pratica clinica della American Diabetes Association (ADA) hanno stabilito che la A1c può essere aggiunta al glucosio plasmatico a digiuno (FPG) ed al test da carico di glucosio (OGTT) per lo screening e diagnosi di diabete.

Il nostro laboratorio, rispettando le ultime linee Guida ADA, esegue i dosaggi dell'HbA1c con metodo HPLC *(metodo analitico di riferimento per NCCLS)*.

Il metodo HPLC per la determinazione dell'Emoglobina Glicata è l'unico approvato da:

Associazione Medici Diabetologi e Società Italiana di Diabetologia.

IL TEST SI ESEGUE CON UN PRELIEVO DI SANGUE SENZA PRENOTAZIONE.

Per ulteriori informazioni contattare il centro: 095 355 888 o inoltrare una e-mail: info@analisicata.com

Esami Correlati:
Glicemia
Fruttosamina
Insulina
Glucagone

